

à ponctuation assez forte et écartée: élytres subparallèles, à dépression antérieure nette.

Longueur : 2,8-3 millimètres.

Moyen Chari, Fort Archambault, avril 1904.

Voisin de *floralis* L. et distinct, à première vue, par son système de coloration.

NOTE SUR LE *TABANUS AGRESTIS* WIEDEMANN,

PAR M. JACQUES SURCOUF,

CHEF DES TRAVAUX DE ZOOLOGIE AU LABORATOIRE COLONIAL DU MUSÉUM.

Le *Tabanus agrestis* a été décrit comme étant d'Égypte, par WIEDEMANN en 1828. WALKER le signale à nouveau en 1854.

Le Docteur WALTER INNÈS-BEY nous a adressé récemment de nombreux spécimens de Taons d'Égypte, mais le *Tabanus agrestis* ne s'y trouvait pas.

En juillet dernier, M. HUGUES ATGER nous a envoyé de la Camargue et de Saint-Geniès-de-Malgoirans (Gard) 7 exemplaires du *Tabanus agrestis* Wiedemann. D'après notre ami le Docteur VILLENEUVE, à qui nous les avons soumis, cette espèce avait été regardée par BRAUER comme une variété de *Tabanus fulvus*.

Le Docteur VILLENEUVE possède deux exemplaires identiques provenant de Lattes (Hérault) et les considère comme correspondant à la description de WIEDEMANN.

Il est possible qu'il y ait eu une erreur commise au début par WIEDEMANN; plus récemment, les Entomologistes tels que WALKER ont simplement reproduit sa diagnose et l'Insecte a été ainsi gratifié d'un habitat inexact.

Il y a donc lieu de considérer le *Tabanus agrestis* Wiedemann comme une espèce de France.

MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVIATILES DE L'ASIE ANTÉRIEURE
(2^e NOTE⁽¹⁾),

PAR M. LOUIS GERMAIN.

Avec M. J. DE MORGAN, j'entends par Asie Antérieure toutes les régions comprises au Sud des monts Caucase, au Sud de l'Atrek, à l'Ouest de l'In-

(1) La première note de cette série a paru dans le *Bulletin du Muséum* (XVII, 1911, n° 1, janvier, p. 27-32), sous le titre : *Note préliminaire sur les Mollusques terrestres et fluviaux recueillis par M. H. GADEAU DE KERVILLE, pendant son voyage en Syrie.*